

Informationsblatt für Patienten:innen zu Behandlung zu Behandlung von aktinischen Keratosen mittels Tirbanibulin- haltiger Creme

Bei Ihnen wurde eine Hautkrebs-Vorstufe (z. B. eine aktinische Keratose) diagnostiziert.
Die Behandlung erfolgt mit **einer Creme mit dem Wirkstoff: Tirbanibulin.**

Anwendung

- **1× täglich für 5 aufeinanderfolgende Tage**
- Dünn auf das betroffene Areal auftragen
- Hände nach dem Auftragen gründlich waschen
- Kontakt mit Augen, Lippen und Schleimhäuten vermeiden
- Keine Abdeckung mit Verband
- Nach dem Auftragen ca. 8 Stunden nicht waschen

Erwartbare Hautreaktionen

Die Hautreaktion ist **gewollt und Zeichen der Wirksamkeit.** Die stärkste Reaktion tritt häufig **einige Tage nach Abschluss der 5-Tage-Therapie** auf.

Die Abheilung erfolgt meist innerhalb von **2–4 Wochen**

- Rötung
- Entzündung mit Brennen
- Nässen / Krustenbildung
- Schwellung
- Abschuppung
- Überempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht
- Abheilung mit neuer, rosiger Haut

Bei starken Schmerzen, Fieber oder Anzeichen einer Infektion bitte ärztlich vorstellen.

Pflegetipps während der Behandlung

- Milde, unparfümierte Reinigung verwenden
- Keine Peelings oder alkoholhaltigen Produkte
- Keine reizenden Kosmetika
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Sonnenschutz erst nach Abheilung bzw. nach ärztlicher Empfehlung verwenden.
Wundcremes mit einem Lichtschutzfaktor bieten eine Alternative.
- Kühlende Umschläge bei Brennen möglich