



Informationsblatt für Patienten:innen zu Behandlung eines weißen Hautkrebses mittels Fluorouracil- haltiger Creme

Bei Ihnen wurde eine frühe Form von „weißem Hautkrebs“ oder eine Hautkrebs-Vorstufe (z. B. eine aktinische Keratose) diagnostiziert.

Die Behandlung erfolgt mit **einer Creme mit dem Wirkstoff: Fluorouracil**. Es zerstört gezielt sonnengeschädigte und krankhaft veränderte Hautzellen.

Behandlungsanweisung:

- Tolak:** 1×tägl. dünn auf die betroffene Stellen Areale über 6 Wochen auftragen
- Efudix:** 2xtägl. dünn auf die betroffenen Areale über 2-4 Wochen auftragen

Allgemeine Anwendungshinweise

- Dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen
- Hände nach dem Auftragen gründlich waschen
- Kontakt mit Augen, Lippen und Schleimhäuten vermeiden
- Nicht auf offene Wunden auftragen
- **Keine** Okklusivverbände
- Behandlung nicht eigenständig verkürzen oder verlängern

Erwartbare Hautreaktionen

Die Hautreaktion ist **gewollt und Zeichen der Wirksamkeit**.

- Rötung
- Entzündung mit Brennen
- Nässen / Krustenbildung
- Schwellung
- Abschuppung
- Überempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht
- Abheilung mit neuer, rosiger Haut

Die Reaktion kann deutlich ausgeprägt sein und im Verlauf stärker erscheinen. **Bei starken Schmerzen, Fieber oder Anzeichen einer Infektion bitte ärztlich vorstellen. Pflegetipps während der Behandlung**

- Milde, unparfümierte Reinigung verwenden
- Keine Peelings oder alkoholhaltigen Produkte
- Keine reizenden Kosmetika
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Sonnenschutz erst nach Abheilung bzw. nach ärztlicher Empfehlung verwenden. Wundcremes mit einem Lichtschutzfaktor bieten eine Alternative.
- Kühlende Umschläge bei Brennen möglich